令和５年度用

ロタウイルス感染症　予防接種を受ける方へ

★ロタウイルス胃腸炎とは★

口から侵入したロタウイルスが腸管に感染して発症します。感染力が非常に強く乳幼児期のうちにほとんどの子どもが感染します。ロタウイルスによる胃腸炎は、急激な嘔吐と水様性の下痢便を頻回に排泄し、発熱が３割から５割程度みられます。下痢・嘔吐が激しくなると脱水症状を起こす場合もあり、まれに腎不全、脳症などの合併のため入院治療に至るケースがあります。生後、すぐに感染する場合もあるので、ワクチンの接種は、できるだけ早く始めて早く完了させましょう。

1　ワクチンの種類・接種時期・接種回数

ワクチンの種類	ロタリックス® （経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン）	ロタテック® （五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン）
接種時期	出生６週から24週０日後まで 標準初回接種は 生後２か月～出生14週６日後まで	出生６週から32週０日後まで 標準初回接種は 生後２か月～出生14週６日後まで
接種回数	２回 （27日以上の間隔をあける）	３回 （27日以上の間隔をあける）

※２種類とも効果に差がありませんが、接種回数が異なりますので主治医と相談して選択してください。原則として、同一ワクチンを接種してください。

※飲むワクチンなので接種直前（30分ほど）は授乳を控えましょう。うまく飲み込めなかったり吐き戻しても、わずかでも飲み込みがあれば効果に問題はないため、飲み直す必要はありません。

※接種後１～２週間は腸重積症の発症に注意が必要です。接種前に「６　腸重積症について」を必ずお読みください。

2　接種場所　裏面「ロタウイルス感染症予防接種指定医療機関」をご覧ください。

3　一般的注意

（１）　事前に予約が必要です。（詳しくは各医療機関にお問い合わせください。）
〈予約時に伝えること〉
- 予防接種の種類：ロタウイルス感染症予防接種
- 接種者の氏名、生年月日、保護者名、住所、電話番号
- 最近接種した予防接種名と接種年月日
- （２回目以降の場合）前回のロタウイルスワクチンの種類

（２）　予約日に、都合により接種できない場合や体調が悪い場合は、予約先に連絡し予約日を変更してください。

（３）　予診票は事前に記入してください。
- 太枠で囲ってある部分を、黒のボールペンで記入してください。
- 診察前体温は、接種前に医療機関で測定した体温を記入します。

（４）　接種当日は母子健康手帳（又は接種歴が記載してある手帳等）、予診票、健康保険証、子ども医療費受給者証（該当する場合）を持参してください。

（５）　接種は健康状態の良好なときに受けてください。

（６）　本紙「ロタウイルス感染症予防接種を受ける方へ」をよく読み、必要性や副反応についてよくご理解のうえ、接種を受けてください。

（７）　ガンマグロブリン製剤の注射を受けたことがあるお子さんについての接種時期については、かかりつけ医と相談してください。

（８）　原則、任意で接種したものは、定期接種に相当するとしてカウントします。

4　予防接種を受けることができない方

（１）　明らかに発熱のある方（医療機関で37.5℃以上）

（２）　重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

（３）　接種しようとする接種液の成分によって、「アナフィラキシー※」を起こしたことが明らかな方
※アナフィラキシーとは接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。

（４）　未治療の先天性消化管障害（メッケル憩室等）や腸重積症の既往のある方、重症複合免疫不全症（ＳＣＩＤ）を有する方

（５）　その他、医師が接種不適当と判断した場合、また感染性の疾患に罹患・接触した場合も、一定期間接種できないことがあります。

5　接種後の注意・ワクチンの副反応

接種直後は、医療機関で30分ほど様子を見てから帰宅してください。ワクチン接種後２週間ほどは、便の中にワクチンのウイルスが含まれることがあります。おむつ交換の後など丁寧に手を洗ってください。主な副反応としては、下痢、嘔吐、胃腸炎、発熱、ぐずりなどがあります。また、腸重積症の症状に注意し、異常を感じた場合は、すぐに接種した医療機関を受診してください。

重い健康被害が生じた場合、厚生労働大臣が予防接種によるものと認定したときは、予防接種健康被害救済制度の給付対象となります。

6　腸重積症について

腸重積症とは、腸が腸に入り込み、閉塞状態になることです。（下図）。０歳児の場合、ロタワクチンを接種しなくても起こる病気で、もともと、３～４か月齢ぐらいから月齢が上がるにつれて多くなります（右下グラフ）。早めに接種を開始し、完了させることが推奨されています。





腸重積症は、手術が必要になることがありますが、発症後、早く治療すれば、ほとんどの場合、手術をせずに治療できます。以下のような症状が一つでも現れたら、腸重積症が疑われます。

- ■泣いたり不機嫌になったりを繰り返す
- ■嘔吐を繰り返す
- ■ぐったりして顔色が悪くなる
- ■血便がでる

このような症状に気付いたら、すみやかに接種した医療機関を受診してください。接種した医療機関とは別の医療機関を受診する場合は、医師にロタワクチンを接種したことを伝えてください。

お問い合わせは各市町村の保健センターへ

津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

令和５年度　ロタウイルス感染症　予防接種指定医療機関一覧

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

※令和６年４月１日以降に接種される場合は、指定医療機関が変更されている可能性がありますので、各保健センターへお問い合わせください。

※指定医療機関等の都合により変更になる場合があります。

市町村名	医療機関名	電話番号
津島市 市外局番 0567	あいち健康クリニック	23-1212
	井田医院	26-2676
	加藤医院	24-1515
	神守診療所	28-3650
	篠田内科	25-6331
	すぎの大人こどもクリニック	25-8122
	杉山クリニック	26-2006
	貴子ウィメンズクリニック	23-5786
	田中こどもクリニック	26-2409
	つしまこどもアレルギークリニック	55-8718
	つしまセントラルクリニック	55-9111
	坪内医院	28-6300
	はせ川外科	24-3370
	ひだかファミリークリニック	26-2220
	平井クリニック	33-0888
	平野医院	26-7584
	松永医院	26-2022
	ワシノ医院	26-2851

市町村名	医療機関名	電話番号
愛西市 市外局番 0567	加藤クリニック	22-3000
	産婦人科佐屋クリニック	28-0311
	谷本医院	28-9888
	角鹿医院	28-0135
	まえだこどもクリニック	22-1211 予約専用 22-1233
	前田ホームクリニック	23-2414
	山本ウィメンズクリニック	33-1177
弥富市 市外局番 0567	あいち診療所おふくろ	67-7202
	小笠原クリニック	56-5533
	小林医院	65-6655
	篠田医院	64-2111
	杉本クリニック	68-5656
	すずきこどもクリニック	52-1000
	日比クリニック	65-6666

市町村名	医療機関名	電話番号
あま市 市外局番 052	浅井外科クリニック	441-8002
	安藤クリニック	444-1508
	伊東医院	444-1033
	伊藤医院	441-2408
	岩間クリニック	442-7030
	栄生堂医院	444-2008
	駅前ふじたクリニック	462-0222
	小野クリニック	445-2221
	加藤医院	441-5557
	近藤内科クリニック	444-0016
	近藤療院 六町クリニック	443-7145
	しげやす内科クリニック	449-5550
	杉村医院	443-1331
	原クリニック	441-1117
	フジノ内科	441-2713
	マスブン医院	445-3037
	宮地クリニック	444-1064
	村上医院	443-7771
	もちづき内科&はるかこどもクリニック	443-3320
	吉岡クリニック	441-5211
	よつ葉ファミリークリニック	526-6767

市町村名	医療機関名	電話番号
大治町 市外局番 052	安藤医院	444-2301
	こうのう内科	443-3631
	たかだこどもクリニック	443-3350
	中原クリニック	449-1313
	はら医院	443-6662
	みきクリニック	444-7005
	みずのホームクリニック	444-2270
	むらかみファミリークリニック	445-1222
蟹江町 市外局番 0567	飯田ファミリークリニック	94-4891
	回生堂クリニック	96-5707
	かとうクリニック	96-2233
	かにえ診療所	94-1611
	久保田内科クリニック	96-2600
	すぎうらクリニック	97-0700
	耳鼻咽喉科たけうちクリニック	94-5505
	成山ひだまりクリニック	94-7680
	ふなとクリニック	95-0088
	前田内科	95-8434
	増田医院	95-1615
	やまだクリニック	96-5600
	山本医院	95-9311
飛島村 市外局番 0567	加藤胃腸科内科 とびしまこどもクリニック	52-2000

◎お問い合わせは各市町村の保健センターへ
津島市、愛西市、弥富市、あま市
大治町、蟹江町、飛島村